

## Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden viitteellinen henkilöstötarpeen arviointitaulukko (versio 2.)

Asiakkaiden palvelutarve	TUVA-mittari	InterRAI-CMH –arviointijärjestelmän mittareita					Huomioita asiakkaan palvelutarpeista	Käytettävät palvelut	Suositeltava henkilöstömäärä
	TUVA-indeksi (0-10)  muodostuu osioista: päivittäiset toiminnot, oireet ja hoitoisuus.	IHIER-C (0-6) Välineelliset arkitoinnot, aterioiden valmistus, tavalliset kotityöt, raha-asioiden hoito, lääkityksestä huolehtiminen ja puhelimen käyttö.	CPS (1-6) Kognitio, kuten päätöksenteon taidot, tunnistaminen, ajattelu ja muistaminen.	SOS (1-6) Itsensä vahingoittamisen ennuste, kuten, toivottomuuden ilmaiset, itsemurhasuunnitelmat ja käskevät aistiharhat.	RHO (1-6) Toisten vahingoittamisen ennuste, kuten muiden pelottelu tai väkivallalla uhkaaminen, karkea kielenkäyttö ja pahoinpity.	NSS (0-12) Negatiivisten oireiden asteikko, kuten vetäytymistä, motivaation puutetta ja mielihyvän puuttumista.			
<b>Vähäinen, ajoittainen tai jatkuva palvelutarve</b>	< 2  2 - 4	0 = Itsenäinen 1 = Ohjauksen tarvetta 2 = Rajoitettu avuntarve 3 = Kohtalainen avuntarve	Ei häiriötä/ Kognition lievä heikkeneminen 0 – 3	Ennuste matala 0-1  Ennuste keskitaso 2-3	Ennuste matala 0-1  Ennuste keskitaso 2-3	Ei oireita/ Vähän oireita 0-3	Asiakkaalla - ajoittainen ohjauksen ja tuen tarve päivittäisissä toiminnoissa - tuen tarve kodin ulkopuoliseen toimintaan osallistumisessa - valvotun lääkehoidon tai lääkehoidon seurannan tarve - voi olla lyhytaikaista itsenäiseen asumiseen tähtäävää tai pidempiaikaista palvelutarvetta	Avohoidon tukipalvelut/ Kotihoito/ Tuettu asuminen/ Yhteisöllinen asuminen	Henkilöstömäärä muodostuu asiakkaiden yksilöllisten palvelutarpeiden mukaan (palvelupäätös)
<b>Ympärivuorokautinen palvelutarve</b>	4 - 6	4 = Runsas avuntarve	Kognition keskivaikea heikkeneminen 3 - 4	Ennuste keskitaso 2-3	Ennuste keskitaso 2-3	Kohtalaisesti oireita 4-7	Asiakkaalla - tarve ympärivuorokautiseen ohjaukseen ja tukeen (tarpeiden runsaus ja ennakoimattomuus) - psyykinen sairaus voi aiheuttaa tuen tarvetta yöaikaan - valvotun lääkehoidon tarve	Ympärivuorokautinen palveluasuminen (lyhyt- tai pitkäaikainen)	0,50 – 0,60
<b>Runsas ympärivuorokautinen palvelutarve</b>	6 - 10	5 = Autettava 6 = Täysin autettava	Kognition vaikea heikkeneminen 4 - 6	Ennuste korkea 4-6	Ennuste korkea 4-6	Paljon oireita 8-12	Asiakkaalla - runsas avuntarve päivittäisistä toiminnoista selviytymiseksi, myös ikääntyneillä - alkoholimentia - itselleen tai toisille vaarallinen käytös - impulsiivisuutta, ennakoimatonta käytöstä - vaikea käytöshäiriö - jatkuva/runsas hoitajan läsnäolon tarve	Ympärivuorokautinen palveluasuminen	0,60 –